



دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

واحد آموزش بیمار



گروه هدف: بیمار

مراقبت های پس از گچ گیری و آموزش پس از ترخیص

منبع: پرونر سودا ۲۰۱۸

تهیه: خ زاهدی سرپرستار بخش تروما

- درد و زخم زیر قالب گچی که با تغییر وضعیت دادن عضو تسکین پیدا نمی کند.
- سردی انگشتان دست یا پا که پس از ۲۰ دقیقه پوشاندن ، گرم نشوند.
- افزایش تورم
- سوزن سوزن شدن یا احساس سوزش
- بوی تعفن اطراف لبه های گچی
- هرگونه شکستگی در قالب گچی

Golestanhospital@ajums.ac.ir

- بیمار تا ۴۸ ساعت پس از گچ گیری ، با پای دارای قالب گچی نباید راه برود مگر پزشک دستور دیگری در این رابطه داشته باشند.
- در صورتی که گچ دچار تغییر رنگ یا بوی بد گردید، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.
- برای پاک کردن لکه های روی قالب گچی ، می توان از یک پارچه تمیز و مرطوب و پودرهای تمیز کننده استفاده نمود.
- ورزش های تقویت عضلات اندام زیر گچ را بطور مرتب انجام دهید . تا قدرت عضلانی اندام حفظ شود. مانند شل و سفت کردن عضلات ران و زانو و مچ و
- رژیم غذایی سرشار از کلسیم و ویتامین و پروتئین داشته باشید.
- روزانه حداقل ۳ لیتر مایعات به خصوص آب بنوشید.
- در صورت کاهش یافتن و گشاد شدن قالب گچی ، ممکن است برای اطمینان از بی حرکت بودن استخوانهای شکسته و جا به جا شدن آنها، نیاز باشد تا قالب گچی توسط پزشک تعویض شود.
- موارد هشدار دهنده :
- در صورت ترک برداشتن ، سست شدن و یا گشاد شدن زیاد از حد قالب گچی

قالب های گچی برای بی حرکت کردن بافت عضلانی و اسکلتی به دنبال تروما و یا جراحی استفاده می شود. این قالب های گچی از گچ پلاستیک و فایبرگلاس یا نوارهای گچی ساخته می شود. فایبرگلاس دارای برخی مزایا نسبت به گچ می باشد. چرا که این قالب ها در صورت مرطوب شدن، صدمه جدی به آنها وارد نمی شود، سبک وزن هستند و برای مدت طولانی تری قابل استفاده می باشند بانداز گچی که بصورت نواری و یا حلقه پیچیده شده در دسترس می باشد پس از فرو بردن در آب بر روی بخش آسیب دیده پیچیده می شود.

این قالب به شکل عضو آسیب دیده خشک شده و فرم می گیرد.



معمولاً در زیر قالب گچی از یک بانداز نرم یا پنبه استفاده می شود تا گچ به طور مستقیم یا پوست در تماس نباشد.

مراقبت از قالب گچی:

قالب های گچی از جنس گچ ۲ تا ۳ روز و قالب های فایبرگلاس طی یک روز خشک می شوند.

تا زمانی که قالب گچی مرطوب است. آن را بر روی یک بالش سفت بدون روکش پلاستیکی قرار دهید تا از بد شکل شدن قالب جلوگیری نمایید.



تا زمانی که گچ خشک می شود در زیر آن احساس گرما وجود دارد ولی اگر پس از خشک شدن قالب گچی در عضو گرما احساس شود. می تواند علامت عفونت باشد و باید فوراً به پزشک مراجعه نمود.

از نوشتن یا رنگی کردن گچ جداً پرهیزید.

برای اینکه قالب گچی زودتر خشک شود. برای سرعت بخشیدن به خشک شدن گچ می توان از پنکه در فاصله ای مناسب از گچ قرار داد.

برای خشک کردن قالب گچی نباید از لامپ های حرارتی استفاده کرد. چون ممکن است باعث سوختگی پوست زیر قالب گچی شود.

جهت حمام رفتن و یا بیرون رفتن در هوای بارانی چنانچه قالب گچی از جنس گچ باشد باید قالب با کیسه پلاستیکی پوشانده شود.

از وارد کردن وسایل تیز مانند تکه چوب یا قطعات پلاستیکی یا فلزی به زیر قالب گچی خود داری نمایید چون در صورت زخمی شدن پوست زیر قالب گچی احتمال عفونت وجود خواهد داشت.

اندام گچ گیری شده را تا یک هفته بالا تر از سطح قلب نگاه دارید.

در صورت تورم اندام گچ گیری شده یا تغییر رنگ و گرم شدن یا از بین رفتن حس اندام سریعاً به پزشک خود مراجعه نمایید.

