



دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

واحد آموزش بیمار



تهیه: فغ مسینی

گروه هدف: بیماران وفانواده

مراجع: اعصاب: تابستان 97

بازنگری: فغ. سلطانی. دی 99

- داشتن مزه شور و مکرر در دهان و مایع زلال در گوش و بینی و یا ترشح از ممل عمل .

- خواب آلودگی وضعیتی و ناتوانی

- تشنج

- تب بالا - تعریق

- گرفتگی عضلات گردن و فشگی گردن

- افتلال دید .

- درد قفسه سینه

منبع: بخش جراحی اعصاب تابستان 97
مجله دانشکده پزشکی اصفهان دکتر
مسعودی فر - سایت پرستاران توانمند

انجام داده اند مصرف آن کاهش پیدا میکند آرامبخش های عضلانی جهت تشکین درد.

مراقبت ها : عدم قرار گرفتن در هوای گرم و

جلوگیری از دست رفتن آب بدن وضعیتی صمیع

سر جهت جلوگیری از افزایش در سر - جلوگیری از

سر درد - خود داری از پرفاندن بیش از مد سر -

فوردن غذاهای پر فیبر و سبزیها - جلوگیری از

مانور والسالوا و زور زدن در هنگام دفع مدفوع -

خود داری از عطسه و سرفه و باد انداختن در بینی

- عدم بلند کردن اجسام سنگین - کشیدن بویه

10 تا 12 روز بعد و جلوگیری از رسیدن آب به

ممل زخم تا 2 روز کشیدن بویه ها - قرا گرفتن

در محیط آرام جهت کاهش سردرد

در صورت علایم زیر مراجعه به پزشک :

کرانیوم از 22 استخوان شامل 14 استخوان در سر شامل فرونتال، اکسی پیتال ، اتموئید ، اسفنوئید ، آهیانه و گیجگاهی تشکیل شده است . **کرانیوتومی** نام عمل جراحی است که قسمتی از استخوان سر به طور موقت جهت دسترسی به بافت مغز و ایجاد فضای بیشتر برداشته می شود هدف از این کار خارج کردن تومور و لخته های خون - کاهش ICP - کاهش تورم مغزی - ترمیم عروق فونی - تخلیه آبسه مغزی - هماتوم ساب دورال و کاشت ممرک های مغزی عمیق در بیماران مبتلا به پارکینسون و صرع .

کرانیوتومی :/قرار دادن مجدد جمجمه در محل قبلی فود و یا ترمیم جمجمه جهت بهبود شکل ظاهری و یا ترمیم بافت از بین رفته و فردشده جمجمه .

افراد کاندید کرانیوتومی افرادی که با آسیب شدید مغزی و هماتوم مغزی (خونریزی خارج مغزی و زیر جمجمه) افرادی که از داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین استفاده میکنند - افراد هموفیلی - افراد سالخورده که دارای سیاهرگ های نازک در نامیه مغز میباشند.

روش عمل : پس از تصویر برداری MRI ممل دقیق استخوان و زاویه مناسب برای دسترسی به منطق مربوطه را مشخص میکند جمجمه پس از برداشتن ممکن است در محیط هایی مانند بانک های استخوانی و یا در دمای پایین به صورت استریل و یا در محیط زنده مانند شکم بیمار نگهداری شود. سپس قطعه استخوان به وسیله ی فلزیتانیوم و پیچ و تثبیت کننده ها در جای فود قرار داده می شود جهت ترمیم استخوان از

بین رفته نیز از سیمان استخوانی استفاده میکنند.

فطرات :تشنج - انفارکتوس مغزی - مننژیت باکتریایی - کاهش سطح هوشیاری - آسیب داخلی مغز و معلولیت های مربوطه - نشست مایع مغزی نفاعی - آسیب عصبی و فلج عضلانی و ضعف ماهیچه ای عوارض بیماری شامل : سردرد که ممکن است 2 ماه طول بکشد - ورم صورت و گودی در اطرف چشم - بی بسی اطراف زخم و سوزش و خارش - فستگی عمومی

داروها : داروهای ضد تشنج که قبل از عمل جراحی برای بیمار شروع می شود - آمپول دگزامتازون که باعث کاهش ادم در مغز و اتساع عروق می شود اما کسانی که عمل جراحی باز