

آبسه مغزی چیست؟

تجمع چرک ناشی از یک عفونت باکتریال در مغز یا خارجی ترین لایه از سرکه لایه غشایی مغز را می پوشاند.

علائم شایع:

- سردرد شدید و مداوم

- تب و لرز

- تهوع و استفراغ

- تشنج

- اختلال در هوشیاری یا خواب آلودگی

- ضعف یا بی حسی یک سمت بدن

- تاری دید یا دوبینی

- تغییرات رفتاری یا گیجی

علل یا عوامل خطر:

انتشار عفونت از گوش میانی و سینوس ها، دندان های عفونی، عفونت های خون، ضربه به سر و جراحی مغز

- نقص ایمنی HIV

- مصرف کورتون

- دیابت کنترل نشده

روش های تشخیصی:

- MRI

- CT اسکن

- آسپیراسیون آبسه

- کشت خون

- الکتروآنسفالوگرام

- آزمایش مایع نخاع

درمان:

- استفاده از آنتی بیوتیک 4-6 هفته

- کورتیکواستروئیدها جهت کاهش تورم مغزی پس از عمل

- داروهای ضد تشنج (فنی توئین، فنو باربیتال) جهت

پیشگیری از حملات تشنجی.

درمان جراحی:

- تخلیه آبسه

عوارض:

- بالا رفتن فشار مغزی به علت درد و تورم

- بروز حمله تشنجی

- نقص عصبی

- اغماء (کاهش سطح هوشیاری)

پیشگیری:

- درمان سریع عفونت های سینوس و دندان

- استفاده از تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از ضربه به سر

- مدیریت بیماری هایی که ایمنی را کاهش می دهند.



دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

واحد آموزش بیمار



گروه هدف: بیمار و خانواده

آبسه مغزی

تهیه: نخ.ز. سهرابی، پرستار بخش نوروسرجری

آذر: 1404

منبع: کتاب هاریسون فصل عفونت های عصبی مرکزی

Golestan.ajums.ac.ir

آموزش بیمار:

- پانسمان محل عمل هرروز تعویض شود در صورت ترشح
مراجعه به پزشک.
- کنترل درجه حرارت، در صورت بروز تب و لرز و تشنج
سریعاً مراجعه به پزشک.
- مصرف مسکن و آنتی بیوتیک خوراکی طبق دستور
پزشک.
- انجام فعالیت باتوجه به قدرت بدنی رژیم غذایی سرشار
از پروتئین و مصرف مایعات.
- مراجعه به پزشک دو هفته بعد از ترخیص.



تشخیص و درمان در آبسه مغزی زود هنگام می تواند
از عوارض جدی مانند آسیب دائمی مغز یا مرگ جلوگیری
کند.