



دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

واحد آموزش بیمار



گروه هدف: بیمار و خانواده

نشت مایع مغزی نخاعی

تهیه: ااذر افرا، پرستار، بخش جراحی اعصاب

آذر: 1404

منبع: مروری بر کلیات جراحی اعصاب

H.Golestan.ajums.ac.ir

علایم و نشانه های مایع مغزی نخاعی:

سردرد // تهوع و استفراغ // مشکلات تعادل // ترشح شفاف از گوش (اتورِه) // وزوز و صدای زنگ زدن گوش // احساسیت به نور و صدا // (ترشح شفاف از بینی (رینوره).

تشخیص:

- تصویر برداری برای ارزیابی جریان مایع مغزی، نخاعی.

- تصویر برداری از نخاع درون کانال نخاع.

- ال پی و معاینه بالینی.

درمان:

برخی از موارد نشت مایع مغزی نخاعی تنها با استراحت بهبود می یابند، برخی دیگر ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد.

مراقبت ها:

پانسمان استریل گوش و بینی در صورت آبریزش از بینی و گوش

// بلند کردن زیر سر 30 تا درجه // اجتناب از بلند کردن

اجسام سنگین // رژیم فیبر و مایعات جهت جلوگیری از

یبوست // هنگام در کشیدن سر را بالا دارید // از فین

کردن بینی و عطسه و سرفه شدید خودداری کنید // استفاده

از اسپری های سالین و مرطوب نگه داشتن مسیرهای

تنفسی // در صورت مشاهده تب، سردرد شدید، سفتی گردن،

تهوع و یا خروج مایع شفاف از بینی گوش یا محل جراحی فوراً

به پزشک خود مراجعه نمایید /

مایع شفافی که مغز و نخاع مهره داران را احاطه کرده و در بطن های مغز یافت می شود.

نشت مایع مغزی نخاعی به دو دسته تقسیم می شود:

1. نشت مایع از جمجمه

علل نشت مایع مغزی نخاعی از جمجمه:

1. آسیب به سر.

2. افزایش فشار مغز.

3. شانت هایی که به درستی کار نمی کنند.

4. ناهنجاری های گوش داخلی.

2. نشت مایع از نخاع

علل نشت مایع مغزی نخاعی از نخاع:

1. کشیدن مایع از کمر یا همان ال پی .

2. آسیب به سر و ستون فقرات.

3. جراحی قبلی روی ستون فقرات.

4. فستول های وریدی.

5. ناهنجاری های ریشه ای عصب نخاعی.